



KOAH'ta Uzun Sureli Tedavi & GOLD 2023

Dr.Glistan Karadeniz

SB.Dr.Suat Seren Gđs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM/ İzmir

Trabzon Solunum Buluşması

21.10.23

Sunum Planı

Global Initiative for
Chronic Obstructive
Lung Disease

2023
REPORT

- KOAH Tanımı, Risk Faktörleri ve Tanı
- Tanımlamalar ve Etyolojik sınıflama
- KOAH Yönetimi
- Stabil KOAH'ta Tedavi Amaçları
- Mortaliteyi Azaltıcı Kanıtlar
- Farmakolojik ve Non-farmakolojik Tedaviler ve Anahtar Noktalar
- Başlangıç ve Takip Farmakolojik Tedavisi
- Alevlenmeleri Azaltıcı Girişimler



This slide set is restricted for academic and educational purposes only. Use of the slide set, or of individual slides, for commercial or promotional purposes requires approval from GOLD.

© 2022, 2023 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

**Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of
Chronic Obstructive Pulmonary Disease**

KOAH Tanım

- Kalıcı, **sıklıkla progressif** hava akımı obstrüksiyonuna neden olan

havayolları (bronşit, bronşiolit) ve alveollerde (amfizem) anormalliklerin neden olduğu


kronik solunumsal semptomlar (nefes darlığı, öksürük, balgam ve **alevlenmeler**) ile karakterize

heterojen bir akciğer hastalığıdır

Risk Faktörleri

- Akciğerlere zarar verebilen ve/veya akciğerlerin normal gelişim ve yaşlanma sürecini değiştirebilen bireyin **yaşamı boyunca gen ve çevre** etkileşiminden kaynaklanır (**GET**)
- Sigara (Aktif / Pasif), mesleki/çevresel maruziyetler (organik-inorganik tozlar, kimyasallar, gazlar), hava kirliliği (dış /iç ortam), havayollarındaki inflamasyon (enfeksiyonlar, hiperreaktivite), genetik faktörler (alfa-1 antitripsin eksikliği), akciğerlerin büyüme ve gelişimini etkileyen durumlar, sosyoekonomik faktörler....başlıca KOAH gelişimi ve progresyonunu etkileyen faktörler
- Nadir de olsa KOAH ile ilgili en sık genetik risk faktörü α -1 antitripsin eksikliğine yol açan SERPINA1 genindeki mutasyonlardır.

Tanı

- Tanı için zorunlu => post-bd FEV1/ FVC < 0.7 } KOAH
- FEV1/ FVC \geq 0.7 ancak;
 - solunumsal semptomlar
ve/veya
 - akc yapısal deęişiklikler (amfizem)
ve/veya
 - fizyolojik anormallikler (FEV1 normal-düşük,
hava hapsi, hiperinflasyon, düşük DLCO
ve/veya hızlı FEV1 düşüşü) } pre-KOAH
- Korunmuş oran bozulmuş spirometry
(FEV1/ FVC \geq 0.7 ama FEV1 ve/veya FVC < %80) } PRISm. 
- Pre-KOAH ve PRISm zamanla hava akımı obst gelişebilir ancak tüm vakalarda deęil

Tanımlamalar

- **Erken KOAH:** başlangıca yakın (biyolojik olarak erken)
- **Hafif KOAH:** Hava akımı kısıtlılığı hafif
- **Genç KOAH:** 20-50 yaş arası
- **Pre-KOAH:** FEV1/ FVC \geq 0.7 ancak solunumsal semptomlar ve/veya akciğer yapısal değişiklikler(amfizem) ve/veya fizyolojik anormallikler
- **PRISm:** Korunmuş oran bozulmuş spirometry FEV1 ve/veya FVC<0.8 (prevelansı %7-20, smoker-ex-smokerlarda yüksek ve BMI yüksek ve düşük olması ile ilişkili) (artmış tüm sebeplere bağlı mortalite ile ilişkili)



KOAH için Etyolojik Sınıflama (Taksonomi)

Sınıflama	Tanım
COPD-G (genetik olarak saptanmış)	Alfa-1 AT eksikliği Diğer genetik varyasyonlar
COPD-D (akciğer gelişiminde anormallik)	Erken yaşam olayları (prematür, düşük doğum ağırlığı)
Çevresel KOAH COPD-C (sigara dumanı)	-Sigara dumanı maruziyeti, intrauterin pasif maruziyet -E-sigara -Cannabis
COPD -P (biomas ve hava kirliliği)	Ev içi kirlilik, hava kirliliği, orman yangını, mesleksel maruziyetler
COPD-I (Enfeksiyonlara bağlı)	Çocukluk Enfeksiyonları, Tb ile ilişkili KOAH, HIV ilişkili KOAH
COPD-A (astım)	Özellikle çocukluk Astımı
COPD-U(bilinmeyen sebepler)	Bilinmeyen sebepler

*Adapted from Celli et al. (2022) and Stolz et al. (2022)



KOAH Yönetimi

- Risk faktörlerinden kaçınmak; Sigara Bırakma...
- Aşılar (İnfluenza, Pnömonokok, SARS-Cov2, DBT)
- Farmakolojik Tedaviler
- Düzenli Fiziksel Aktivite
- Pulmoner Rehabilitasyon & Eğitim-Öz Yönetim
- Uzun Süreli Oksijen Tedavisi
- Noninvaziv Ventilatör Desteği
- Cerrahi & Bronkoskopik Volum Azaltıcı Girişimler
- Palyatif Bakım

KOAH Yönetimi

- Risk faktörlerinden kaçınmak; Sigara Bırakma...
- Aşılar (İnfluenza, Pnömonokok, SARS-Cov2, DBT)
- **Farmakolojik Tedaviler**
- Düzenli Fiziksel Aktivite
- Pulmoner Rehabilitasyon & Eğitim-Öz Yönetim
- Uzun Süreli Oksijen Tedavisi
- Noninvaziv Ventilatör Desteği
- Cerrahi & Bronkoskopik Volum Azaltıcı Girişimler
- Palyatif Bakım

Farmakolojik Tedaviler

- Bronkodilatörler
- Metilksantinler
- Anti-inflamatuar Tedaviler
 - İnhaler & Oral KS
 - PDE4 inhibitörü
 - Antibiyotikler
 - Mukoregülatuar & Antioksidanlar
- Alfa-1 AT replasman tedavisi

Farmakolojik Tedaviler

- **Bronkodilatörler**
- Metilksantinler
- Anti-inflamatuar Tedaviler
 - İnhaler & Oral KST
 - PDE4 inh.
 - Antibiyotikler
 - Mukoregülatuar & Antioksidan
- Alfa-1 AT replasman tedavisi

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ

- Semptomlar
- Alevlenmelerin sayı ve ağırlığı
- Kan Eozinofil seviyesi
- Hava akımı kısıtlılığı
- Yan etkiler
- Kororbiditeler
- İlaca ulaşılabilirlik ve maliyet
- Hastanın tercihi ve tedaviye yanıtı

Farmakolojik Tedaviler

- **Bronkodilatörler**
- Metilksantinler
- Anti-inflamatuar Tedaviler
 - İnhaler & Oral KST
 - PDE4 inh.
 - Antibiyotikler
 - Mukoregülatuar & Antioksidan
- Alfa-1 AT replasman tedavisi

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ

- Semptomlar
- Alevlenmelerin sayı ve ağırlığı
- Kan Eozinofil seviyesi
- Hava akımı kısıtlılığı
- Yan etkiler
- Komorbiditeler
- İlaca ulaşılabilirlik ve maliyet
- Hastanın tercihi ve tedaviye

* Her vizitte inhaler teknik-uyum kontrol edilmeli!

mMRC Dispne Skalası

Derece	Tanım
Evre 0	Sadece ağır egzersiz sırasında nefesim daralıyor
Evre 1	Sadece düz yolda hızlı yürüdüğümde ya da hafif yokuş çıkarken nefesim daralıyor
Evre 2	Nefes darlığım nedeniyle düz yolda kendi yaşıtlarıma göre daha yavaş yürümek ya da ara ara durup dinlenmek zorunda kalıyorum
Evre 3	Düz yolda 100m ya da birkaç dakika yürüdükten sonra nefesim daralıyor ve duruyorum
Evre 4	Nefes darlığım yüzünden evden çıkamıyorum veya giyinip soyunurken nefes darlığım oluyor

KOAH Değerlendirme Testi (CAT)

KOAH'da sağlık durumundaki bozulmayı ölçen 8 maddelik bir test. Skor 0-40 arasında ($\geq 10 \rightarrow$ Semptomatik, sağlık durumu bozuk) ($\geq 20 \rightarrow$ Fazla Semptomatik)

Adınız: Bugünün Tarihi:

CAT
COPD Assessment Test

KOAH'ınız ne durumda? KOAH Değerlendirme Testini uygulayın

Bu anket, KOAH'ın sağlığınıza ve günlük yaşamınıza olan etkisinin değerlendirilmesinde size ve sağlık çalışanına yardımcı olacaktır. Cevaplarınız ve test puanınız, siz ve sağlık çalışanınız tarafından hastalığınızı tedavisinde gelişme sağlamak ve bundan en fazla faydayı elde etmeniz için kullanılabilir.

Aşağıdaki her madde için, şu andaki durumunuzu en iyi tanımlayan kutuya (X) işaretli koyun. Her soru için sadece bir cevap seçtiğinizden emin olun.

Örnek: Çok mutluym 0 1 2 3 4 5 Çok kederliyim

	SKOR
Hiç öksürmüyorum <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 Sürekli öksürüyorum	<input type="text"/>
Akciğerlerimde hiç balgam yok <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 Akciğerlerim tamamen balgam dolu	<input type="text"/>
Göğsümden hiç tıkanma/daralma hissetmiyorum <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 Göğsümden çok daralma var	<input type="text"/>
Yokuş veya bir kat merdiven çıkışında nefesim daralmıyor <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 Yokuş veya bir kat merdiven çıkışında nefesim çok daralıyor	<input type="text"/>
Evdaki hareketlerimde hiç zorlanmıyorum <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 Evdaki hareketlerimde çok zorlanıyorum	<input type="text"/>
Akciğerlerimin durumuna rağmen evimden dışarı çıkmaya çekinmiyorum <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 Akciğerlerimin durumu nedeniyle evimden dışarı çıkmaya çekiniyorum	<input type="text"/>
Rahat uyuyorum <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 Akciğerlerimin durumu nedeniyle rahat uyuyamıyorum	<input type="text"/>
Kendimi çok güçlü/enerjik hissediyorum <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 Kendimi hiç güçlü/enerjik hissetmiyorum	<input type="text"/>
TOPLAM SKOR	<input type="text"/>

KOAH Değerlendirme Testi ve CAT logosu, GlaxoSmithKline tarafından geliştirilen bir tıbbi markadır.
© 2009 GlaxoSmithKline. Bütün hakları saklıdır.



GOLD ABE DEĞERLENDİRMESİ

Spirometrik olarak onaylanmış tanı

Hava akımı obstrüksiyonunu değerlendir

Semptomları / Alevlenme riskini değerlendir


Post-bronkodilatör
FEV1/FVC < 0.7

DERECE	FEV1(%)
GOLD 1	≥ 80
GOLD 2	50-79
GOLD 3	30-49
GOLD 4	< 30

ALEVENME ÖYKÜSÜ

≥ 2 orta alevlenme veya
≥ 1 hospitalizasyon gereken alevlenme

0 veya 1 orta alevlenme
(hospitalizasyon gereken Alevlenme yok)



mMRC 0-1
CAT < 10


mMRC ≥ 2
CAT ≥ 10

SEMPTOMLAR

Stabil KOAH için Aşılama

- KOAH hastalarına İnfluenza aşısını öneriyoruz (Kanıt B).
- WHO ve CDC'ı KOAH hastalarına SARS-CoV2(COVID-19) aşısını tavsiye etmektedir (Kanıt B).
- CDC KOAH hastalarında, bir doz 20 valen konjuge pnömokok aşısını(PCV) tavsiye etmektedir; veya bir doz 15 valen PCV takiben bir doz 23 valen polisakkarit pnömokok aşısını tavsiye etmektedir (Kanıt B).
- Pnömonok aşısının KOAH hastalarında alevlenmeleri ve toplum kökenli pnömoni insidansını azalttığı gösterilmiştir (Kanıt B).
- CDC adolesan dönemde aşı olmamış KOAH hastalarına boğmacaya karşı korumak için Tdap aşısını önermektedir (Kanıt B), zona hastalığına karşı korumak için Zoster aşısını önermektedir(Kanıt B).

KOAH Yönetimi



Stabil KOAH 'ta Tedavi Amaçları

- Semptomları rahatlatmak
- Egzersiz toleransını iyileştirmek
- Yaşam kalitesini iyileştirmek

SEMPTOMLARI
AZALTMA

VE

- Progresyonu önlemek
- Alevlenmeleri tedavi etmek ve önlemek
- Mortaliteyi azaltmak

RİSKLERİ AZALTMA

KOAH Hastalarında Farmakolojik ve Nonfarmakolojik Tedaviler ile Mortalitede Azalmayı Destekleyen Kanıtlar




Therapy	RCT*	Treatment effect on mortality	Patient characteristics
Pharmacotherapy			
LABA+LAMA+ICS ¹	Yes	Triple compared to dual LABD relative risk reduction: IMPACT HR 0.72 (95% CI: 0.53, 0.99) ETHOS HR 0.51 (95% CI: 0.33, 0.80)	Symptomatic people with a history of frequent and/or severe exacerbations
Non-Pharmacological Therapy			
Smoking (Sm) Cessation ²	Yes	8.83/1000 person-years (Sm cessation) vs 10.38/1000 person-years (UC) (p = 0.03)	Asymptomatic or mildly symptomatic
Pulmonary Rehabilitation (PR) ³	Yes	After early PR: RR 0.58 (95% CI 0.35, 0.98) and at the longest follow-up RR 0.55 (95% CI 0.12, 2.57)	Hospitalized for exacerbations of COPD (during or ≤ 4 weeks post d/c)
LTOT ⁴	Yes	NOTT, ≥ 19 hours of continuous oxygen vs ≤ 13 hours: 50% reduction MRC, ≥ 15 hours vs no oxygen: 50% reduction	PaO ₂ ≤ 55 or < 60 mmHg with <i>cor pulmonale</i> or secondary polycythemia
NPPV ⁵	Yes	12% in NPPV (high IPAP level) and 33% in control (HR 0.24; 95% CI 0.11, 0.49)	Stable COPD with marked hypercapnia
LVRS ⁶	Yes	0.07 deaths/person-year (LVRS) vs 0.15 deaths/person-year (UC) RR for death 0.47 (p = 0.005)	Upper lobe emphysema and low exercise capacity

*RCT with pre-specified analysis of the mortality outcome (primary or secondary outcome)


1. IMPACT and ETHOS trials (Lipson et al. 2020; Martinez et al. 2021). 2. Lung Health Study (Anthonisen et al. 2005). 3. Review and meta-analysis (Ryrso et al. 2018) 4. NOTT and MRC trials (NOTT 1980; MRC 1981) 5. Kohlein et al., trial (Kohlein et al. 2014) 6. NETT trial (Fishman et al. 2003)

ICS: inhaled corticosteroid; LABA: long-acting B2-agonist; LAMA: long acting anti-muscarinic; LTOT: long-term oxygen therapy; NPPV: noninvasive positive pressure ventilation; LVRS: lung volume reduction surgery; UC: usual treatment control group.

Bronkodilatör Kullanımı için Anahtar Noktalar

- **LABA ve LAMA'lar** semptomları hızlıca rahatlattıkları için, nadiren semptomu olan hastalar hariç, **kısa etkili ajanlara tercih edilir (Kanıt A)**.
-  **Uzun etkili bronkodilatörler ile tedaviye başlarken tercih edilen seçenek bir kombinasyondur(LABA/LAMA)**. Tek bir uzun etkili bronkodilatör ile persistan dispnesi olan hastalarda ikili tedaviye çıkılması gerekir (**Kanıt A**). Kombinasyon tek veya multipl inhaler tedavi olarak verilebilir.
- Inhaler bronkodilatörler, oral bd tercih edilir (**Kanıt A**).
- Teofilin, uzun etkili bronkodilatörlere ulaşılama durumu olmadıkça tavsiye edilmez (**Kanıt B**).

Anti-inflamatuar Ajanların Kullanımı için Anahtar Noktalar

- IKS ile uzun dönem monoterapi tavsiye edilmiyor (**Kanıt A**).
-  KOAH'ta LABA/IKS kullanımını teşvik etmiyoruz. **IKS için bir endikasyon var ise, LABA/LAMA/IKS** kombinasyonunun LABA/IKS'ye üstün olduğu gösterilmiş, bu nedenle tercih edilen seçimdir. Bu kombinasyon tek veya multipl inhaler tedavi olarak verilebilir.
- KOAH'lı hastalarda astım özellikleri varsa, tedavi her zaman bir IKS içermelidir.
- Ağır-çok ağır hava akımım kısıtlılığı, kr bronşiti ve alevlenmeleri olan hastalarda IKS olsun veya olmasın uzun etkili bd tedaviye PDE4 inh eklenmesi düşünülebilir (**Kanıt B**).
- Tercihen, ancak yalnızca değil, eski sigara içenlerde uygun tedaviye rağmen alevlenmeleri olan hastalarda Makrolidler özellikle Azitromisin düşünülebilir (**Kanıt B**).
- Statinler ve/veya Beta-blokerler alevlenmeleri önlemek için tavsiye edilmez (**Kanıt A**).

IKS TEDAVİSİ BAŞLARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Uzun etkili bronkodilatöre IKS eklenirken dikkat edilmesi gereken faktörler
(IKS kesilmesi düşünüldüğünde ise durum farklı)

GÜÇLÜ-ŞEKİLDE KULLANIMINI DESTEKLER

- . KOAH Alevlenme nedeniyle hospitalizasyon öyküsü
- . ≥ 2 orta KOAH alevlenme/yıl
- . Kan eozinofil sayısı ≥ 300 h/ μ l
- . Eşlik eden Astım öyküsü

KULLANIMINI DESTEKLER

- . 1 orta KOAH alevlenmesi/yıl
- . Kan eozinofil sayısı 100-300 h/ μ l

KULLANIMINA KARŞI

- . Tekrarlayan pnömoni olayları
- . Kan eozinofil sayısı < 100 h/ μ l
- . Mikobakteriyal enfeksiyon öyküsü

#despite appropriate long-acting bronchodilator maintenance therapy (see Table 3.4 and Figure 4.3 for recommendations);

*note that blood eosinophils should be seen as a continuum; quoted values represent approximate cut-points; eosinophil counts are likely to fluctuate.

Adapted from & reproduced with permission of the © ERS 2019: *European Respiratory Journal* 52 (6) 1801219; DOI: 10.1183/13993003.01219-2018 Published 13 December 2018

Diğer Farmakolojik Tedaviler için Anahtar Noktalar

- Ağır herediter alfa-1 AT eksikliği ve amfizemi olan hastalar alfa-1 AT yerine koyma tedavileri için aday olabilirler **(Kanıt B)**.
- Antitussifler tavsiye edilmez **(Kanıt C)**.
- Primer Pulmoner HT için uygun olan tedaviler, KOAH'a sekonder PHT olan hastalar için tavsiye edilmez **(Kanıt B)**.
- Düşük doz uzun etkili oral ve parenteral opioitler, ağır KOAH hastalarında dispne tedavisi için düşünülebilir **(Kanıt B)**.

Başlangıç Farmakolojik Tedavi

≥ 2 orta alevlenme
veya
≥ 1 hospitalizasyon
gerekten alevlenme

GRUP E



LABA + LAMA*

consider LABA+LAMA+ICS if blood eos ≥ 300*

0-1 orta alevlenme
(hospitalizasyon
gerekmeyen)

GRUP A

A bronchodilator

mMRC 0-1, CAT < 10

GRUP B



LABA + LAMA*

mMRC ≥ 2, CAT ≥ 10



* Tek inhaler tedavi multipl inhaler tedaviden daha uygun ve etkili olabilir.

Başlangıç Farmakolojik Tedavi

- **GRUP A:**

- ▷ Kısa veya **uzun** etkili bd

- **GRUP B:**

- ▷ **LABA+LAMA:** (Alevlenme ≤ 1 , CAT ≥ 10 olan KOAH hastalarında yapılan RKÇ'da LABA+LAMA'nın LAMA'ya üstün olduğu gösterilmiş.)¹

- ▷ LABA+LAMA uygun olmadığında diğer (LABA veya LAMA) uzun etkili bd tavsiye etmek için kanıt yok. Bireysel değerlendirdir.

- ▷ Komorbiditeler sık!

- **GRUP E:**

- ▷ **LABA+LAMA:** (Mono uzun etkili bd karşı dual kombinasyonun karşılaştırıldığı Cochrane Sistematik Derleme ve Meta-analiz'de KOAH alevlenmelerini azaltmak için LABA.+LAMA kombinasyonu en yüksek etkiyi göstermiştir)²

- ▷ KOAH'ta LABA+IKS kullanımını teşvik etmiyoruz. Bir **IKS kullanımı için endikasyon varsa**, LABA+LAMA+IKS'nin LABA+IKS'ye üstün olduğu gösterildiği için tercih edilen seçim **LABA+LAMA+IKS'dir.**³⁻⁴

- ▷ **Eoz ≥ 300 h/uL ise; LABA+LAMA+IKS.** (Alevlenmeleri önlemede IKS etkisi, kan EOZ sayısı ile korelasyon) (Yeni tanı KOAH'ta üçlü tedavi ile başlama konusunda direkt veri yok, bu nedenle Eoz ≥ 300 h/uL hastalar için)

- ▷ KOAH hastasında eşlik eden bir astım varsa, astım hastaları gibi tedavi edilmesi (IKS kullanımı zorunlu)


¹ Respir Res 2019;20(1):238. the EMAX randomised trial.

² Cochrane Database Syst Rev 2018;12(12):CD12620.

³ N Engl J Med 2018;378(18):1671-80.

⁴ N Engl J Med 2020;383(1):35-48.

Yönetim Döngüsü



Takip Farmakolojik Tedavi

1

EĞER BAŞLANGIÇ TEDAVİSİNE YANIT VERİYORSA, DEVAM ET.

2

YANIT VERMİYORSA:

- ✓ Asıl tedavi hedefini düşün (nefes darlığı veya alevlenmeler).
- Alevlenme ve dispne beraber hedefleniyorsa, alevlenme çizelgesini kullan.
- ✓ Hastayı mevcut tedavine uyan kutuya yerleştir & endikasyonlara uy.
- ✓ Yanıtı gözden geçir, değerlendir ve düzenle.
- ✓ Bu öneriler; ABE gruplarından bağımsızdır.

DYSPNEA

LABA or LAMA

LABA + LAMA*

- İnhaler cihazını veya molekülü değiştirmeyi düşün
- Non-farmakolojik tedavileri uygula
- Nefes darlığının diğer sebeplerini araştır (ve tedavi et)

EXACERBATIONS

LABA or LAMA

LABA + LAMA*

LABA + LAMA + ICS*

Roflumilast

FEV1 < 50% & chronic bronchitis

Azithromycin

Preferentially in former smokers

* Tek inhaler tedavi multipl inhaler tedaviden daha uygun ve etkili olabilir.

** Pnömoni veya diğer yan etkiler varsa IKS kesilmesi düşünülebilir. Kan Eoz ≥ 300 h/uL olan hastalarda alevlenme olasılığında daha yüksek.

Takip Farmakolojik Tedavi

- **KOAH ABE gruplarından bağımsız,**
- **Hedef ihtiyacı belirlemek (semp?/alev?, hem dispne hem de alevlenmesi olan hastada alevlenme algoritmasının kullanılması)**

- **DİSPNE:**

- ▷ Mono BD => **LABA+LAMA**. Eğer yanıt yok => Cihaz veya Molekül değişimi
- ▷ KOAH dışı diğer dispne nedenleri?, inhaler teknik ve tedaviye uyum!

- **ALEVLENMELER:**

- ▷ Mono BD => **LABA+LAMA**
- ▷ Mono BD ve kan Eoz **Eoz ≥ 300 h/uL => LABA+LAMA+IKS²**
- ▷ LABA+LAMA ve Eoz **< 100 h/uL ise IKS cevap olasılığı düşük**
- ▷ LABA+LAMA ve Eoz **≥ 100 h/uL => LABA+LAMA+IKS**
- ▷ **LABA+LAMA+IKS (veya Eoz < 100 h/uL) => - Roflumilast³⁻⁴**

- **Makrolid/Azitromisin** (özellikle aktif smoker olmayanlar)⁵⁻⁶

- Pnömoni veya diğer yan etkiler varsa **IKS kesilmesi⁷⁻⁸ (Eoz ≥ 300 h/uL!)**

- **LABA/IKS kullanan hastalar:**

▷ KOAH hastası astım özellikleri yok (her ne nedenle) LABA/IKS kullanmakta ve semptom ve alevlenmeler açısından iyi kontrol altında ise LABA/IKS 'ye devam etmek bir seçenektir. Ancak hasta **a) alevlenmeler** => tedavi **LABA+LAMA+IKS** arttırılmalı **b) semptomlar** => **LABA+LAMA**'ya değişim düşünülebilir

¹ Cochrane Database Syst Rev 2012; (4): CD0089898.

² N Engl J Med 2018;378(18):1671-80.

³ Lancet 2015;385(9971):857-66. ⁴ Am J Respir Crit Care Med 2016; 194(5):559-67.

⁵ N Engl J Med 2011; 365(8): 689-98. ⁶ Am J Respir Crit Care Med 2014; 189(12):1503-8.

⁷ Am J Respir Crit Care Med 2018;198(3):329-39. ⁸ Am J Respir Crit Care Med 2017; 196(9): 1219-21.

Stabil KOAH'ta Bronkodilatörler

- İnhaler bronkodilatörler semptom yönetiminin merkezidir, semptomları azaltmak ve önlemek için düzenli kullanılır (Kanıt A).
- Düzenli ve gereğinde SABA veya SAMA kullanımı FEV1 ve semptomları iyileştirir (Kanıt A).
- SABA ve SAMA kombinasyonu FEV1 ve semptomları iyileştirmede monokomponentlerine üstündür (Kanıt A).
- LABA ve LAMA'lar anlamlı olarak akciğer fonksiyonları, dispne, yaşam kalitesi ve alevlenme oranlarını azaltır (Kanıt A).
- LAMA'lar LABA'lar ile karşılaştırıldığında alevlenmeleri azaltmada (Kanıt A) ve hospitalizasyonu azaltmada (Kanıt B) daha fazla etkilidir.
- LABA ve LAMA kombinasyonu FEV1 ve semptomları monoterapiye göre daha fazla iyileştirir **(Kanıt A)**, **alevlenmeleri daha fazla azaltır (Kanıt B)**.
- Tiotropium, egzersiz performansını artırarak pulmoner rehabilitasyonun etkinliğini artırır **(Kanıt B)**.
- Teofilinin bronkodilatör etkisi zayıftır **(Kanıt A)**, bu nedenle çok az semptomatik yarar sağlar **(Kanıt B)**.
- Tek cihaz inhaler tedavi multipl cihaz inhaler tedavilerden daha uygun ve etkili olabilir.



STABİL KOAH'TA ANTI-İNFLAMATUAR TEDAVİLER

İNHALER KORTİKO- STEROİDLER



- Orta-çok ağır hava akımı kısıtlılığı ve alevlenmeleri olan KOAH hastalarında LABA/İKS kombinasyonu her bir mono komponente göre akciğer fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini iyileştirmede ve alevlenmeleri azaltmada daha etkilidir **(Kanıt A)**.

- İKS ile düzenli tedavi özellikle ağır hastalarda pnömoni riskini arttırır **(Kanıt A)**.

- * Düşük kan ve balgam Eozinofilleri; daha fazla proteobakter öz. H.İnfluenza varlığı, artmış bakteriyal enfeksiyon ve pnömoni ile ilişkilidir.

- * İKS kullanımından bağımsız, kan Eoz <2'da artmış pnömoni riski kanıtı var **(Kanıt C)**.

- İKS/LAMA/LABA üçlü tedavisi İKS/LABA, LABA/LAMA veya LAMA ile karşılaştırıldığında semptomlar, akciğer fonksiyonları, yaşam kalitesini düzeltir, alevlenmeleri azaltır **(Kanıt A)**. Son dönemde elde edilen veriler sık ve/veya ağır alevlenmeleri olan semptomatik hastalarda üçlü tedavinin LABA +LAMA'ya göre mortalite avantajı olabileceğini düşündürmektedir.

- * Tek cihaz inhaler tedavi multipl cihaz inhaler tedaviden daha uygun ve etkili

ORAL GLUKO KORTİKOİDLER

- Uzun süreli oral glukokortikoidler birçok yan etkiye neden olur **(Kanıt A)**

- ve faydası üzerine kanıt yoktur **(Kanıt C)**.

STABİL KOAH'TA ANTI-İNFLAMATUAR TEDAVİLER

PDE-4 İNHİBİTÖRLERİ

- Alevlenme öyküsü ve ağır-çok ağır KOAH olan kronik bronşit hastalarında;
 - Akciğer fonksiyonlarını düzeltir, orta-ağır alevlenmeleri azaltır (**Kanıt A**).
 - Fiks doz İKS + LABA kullanan hastalarda da akciğer fonksiyonlarını iyileştirir ve alevlenmeleri engeller (**Kanıt A**).

ANTİBİYOTİK- LER

- Uzun dönem Azitromisin ve Eritromisin tedavileri, 1 yıldan fazla süreyle alevlenmeleri azaltır (**Kanıt A**).
- Azitromisin tedavisi bakteriyel direnç insidansında artış (**Kanıt A**) ve işitme testinde bozulma (**Kanıt B**) ile ilişkilidir.


MUKO- REGÜLATUAR ANTİOKSİDAN LAR

- Erdosteine, N-asetilsistein, karbosistein gibi mukolitikler ile düzenli tedavi, seçilmiş popülasyonda alevlenme riskini azaltır (**Kanıt B**).

DİĞER ANTI- İNFLAMATUAR AJANLAR

- Simvastatin, Statin endikasyonu olmaksızın artmış alevlenmeleri olan KOAH hastalarında alevlenme riskini azaltmaz (**Kanıt A**). Ancak gözlemsel çalışmalar metabolik ve kardiyovasküler endikasyonlarla statin kullanan KOAH hastalarında pozitif etkilerinin olabildiğini destekliyor (**Kanıt C**).
- Lökotrienler KOAH'ta yeterli düzeyde çalışılmamıştır.

KOAH'ta Pulmoner Rehabilitasyon, Öz-Yönetim ve Entegre bakım



- PR, stabil hastalarda **dispne**, **yaşam kalitesi** ve **egzersiz toleransını** iyileştirir (**Kanıt A**).
- PR, alevlenmesi olan hastalarda **hospitalizasyonu azaltır** (önceki hospitalizasyondan ≤ 4 hafta)(**Kanıt B**).
- PR, **anksiyete ve depresyon** semptomlarında azalmaya neden olur (**Kanıt A**).


- Eğitimin tek başına etkili olduğu gösterilmemiştir (**Kanıt C**).
- Bir sağlık uzmanıyla iletişim ile öz-yönetim girişimi, yaşam kalitesini iyileştirir, hospitalizasyonları ve acil başvurularını azaltır (**Kanıt B**).

- Entegre bakım ve Tele-sağlık şu anda kanıtlanmış bir fayda sağlamamaktadır (**Kanıt B**).

Stabil KOAH'ta Oksijen Tedavisi ve Ventilatör Desteđi

Oksijen
Tedavisi

Ventilatör Desteđi

- **Ađır kronik istirahat hipoksemisi** olan hastalarda uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) **surviyi artırır (Kanıt A)**.
 - Orta derece istirahat hipoksemisi olan veya egzersizin tetiklediđi desatürasyonu olan stabil KOAH hastalarında USOT, ölüme kadar geçen süre veya ilk yatışa kadar geçen süre veya 6DYM, akciđer fonksiyonu, sađlık durumunda fayda sađladığı gösterilememiştir **(Kanıt A)**.
 - Deniz seviyesinde istirahat oksijenizasyonu, hava yolculuđunda ađır hipoksemi gelişimini dışlamaz **(Kanıt C)**.
-
- Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NPPV), özellikle gündüz persistan hiperkapnisi ($pCO_2 > 53 \text{ mmHg}$) olan  hastalarda son hospitalizasyondan sonra **hospitalizasyonsuz suviyi arttırabilir (Kanıt B)**.



Stabil KOAH'ta Girişimsel Tedaviler

Akciğer Volüm
Azaltıcı Cerrahi

- Post-rehabilitasyon egzersiz kapasitesi düşük, üst lob amfizemi olan ağır amfizem hastalarında **surviyi** iyileştirir (**Kanıt A**).

Büllektomi

- Seçilmiş hastalarda, akciğer fonksiyonu ve egzersiz toleransını iyileştirir, azalmış dispne ile ilişkilidir (**Kanıt C**).

Transplantasyon

- Çok ağır KOAH olan uygun şekilde seçilmiş hastalarda, akciğer transplantasyonunun yaşam kalitesi ve fonksiyonel kapasiteyi iyileştirdiği gösterilmiştir (**Kanıt C**).

Bronkoskopik
Girişimler

- Ağır amfizemli seçili hastalarda, bronkoskopik girişimler ekspiryum sonu akciğer volümünü azaltır ve tedaviyi takip eden 6-12 ayda **egzersiz toleransı**, **yaşam kalitesi** ve **akciğer fonksiyonunu** iyileştirir. Endobronşial valvler (**Kanıt A**); Akciğer coiller (**Kanıt B**); Buhar ablasyon (**Kanıt B**)

Çalışması Devam
eden Bronkoskopik
Girişimler

- Kronik Bronşit ve refrakter alevlenmeleri olan hastalar için Kriyosprey, Reoplasti ve hedeflenmiş akciğer denervasyon teknolojisi için tedavilerin etkililiğini saptamak için Faz III çalışmalar güncel olarak yürütülüyor.





KOAH Hastaları için Güncel ve Önerilen Bronkoskopik ve Cerrahi Girişimler

Semptomlar	Kronik Mukus Üretimi	Alevlenmeler	Dispne
Hastalıklar	- Kronik bronşit	-Akut ve kronik bronşit -Bül -Amfizem -Trakeobronkomalazi	-Bül -Amfizem - Trakeobronkomalazi
Cerrahi ve Bronkoskopik Girişimler	- Nitrojen kriyosprey - Reoplasti	- Hedeflenmiş Akciğer Denervasyonu	-Dev Büllektomi -Havayolu stentleri -EBV -Coil -Termal buhar ablasyon -Yapıştırıcılar -AVAC -Akciğer transplantasyonu

KOAH Alevlenmesi şüphesi ile Başvuran hastalarda Düşünülmesi gereken Katkı sağlayıcı Nedenler

Çok Sık

Pnömoni

- Chest radiograph

Pulmoner Emboli

- Clinical probability assessment (Hemoptysis, surgery, fracture, history of cancer, DVT)
- D-dimer
- CT angiography for pulmonary embolism

Kalp Yetmezliği

- Chest radiograph
- NT Pro-Brain Natriuretic Peptide (Pro-BNP) and BNP
- Echocardiography

Daha Az Sıklıkta

Pömotoraks, Plevral Efüzyon

- Chest radiograph
- Thoracic ultrasound

Myokard infarktüsü ve/veya Kardiyak Aritmiler(Atrial Fibrilasyon/flutter)

- Electrocardiography
- Troponin



Interventions that Reduce the Frequency of COPD Exacerbations

Table 5.10

Intervention Class	Intervention
Bronchodilators	LABAs LAMAs LABA + LAMA
Corticosteroid-containing regimens	LABA + ICS LABA + LAMA + ICS
Anti-inflammatory (non-steroid)	Roflumilast
Anti-infectives	Vaccines Long Term Macrolides
Mucoregulators	N-acetylcysteine Carbocysteine Erdosteine
Various others	Smoking Cessation Rehabilitation Lung Volume Reduction Vitamin D Shielding measures (e.g., mask wearing, minimizing social contact, frequent hand washing)



UASK 2024



Uluslararası Katılımlı
AKCİĞER SAĞLIĞI
KONGRESİ

6-9 Mart 2024
Sueno Deluxe Hotel,
Belek/Antalya

Sizin Sesiniz, Sizin Kongreniz...

Türkçe

English

TEŞEKKÜRLER